



ALLEVAMENTO AMATORIALE DEL CANE DA CACCIA

“DEL BUGALLO”

Razze: Bracco Francese tipo Pirenei

Di “Franco Barsottini”

Iscritto al registro degli addestratori ENCI sez. 1
cani da utilità, compagnia agility e sport

Via Bugallo 1b – Crespina (PI)

Telefono 3381621719

www.allevamentodelbugallo.it
info@allevamentodelbugallo.it

Disturbi derivanti da uno sviluppo comportamentale non corretto;

I disturbi che derivano da un non corretto sviluppo comportamentale hanno all’origine la mancanza di acquisizione degli autocontrolli a causa di un non adeguato sviluppo comportamentale derivante dalla scarsa stimolazione ambientale in cui i cuccioli sono cresciuti (ad esempio la morte della madre).

I disturbi trattati in questa pagina non hanno natura genetica ed i comportamenti descritti hanno come comune denominatore l’incapacità del cane di adattarsi e saper gestire una determinata situazione. Questi disturbi del comportamento possono essere suddivisi in tre categorie:

- Disturbi dell’omeostasi sensoriale;
- Sindrome da privazione sociale
- Disturbi del comportamento sociale

Disturbi dell’omeostasi sensoriale. L’omeostasi sensoriale è la capacità di un soggetto di mantenere costanti le proprie condizioni psicologiche al mutare dell’ambiente esterno, i disturbi derivanti dall’omeostasi sensoriale sono:

- Sindrome ipersensibilità iperattività; I disturbi possono sorgere in cuccioli di età superiore alle 8 settimane, in cani giovani ed in cani adulti, i sintomi principali sono:
 - Mancanza di controllo dei morsi o dei movimenti sia durante il gioco sia nell’interazione con il proprietario.
 - Incapacità di porre fine ad un comportamento, attività motoria esagerata (ad esempio non riesce a smettere di giocare).
 - Ipervigilanza, mancanza di abituazione e difficoltà di concentrarsi (Difficoltà di apprendere).
 - Mancanza di sazietà alimentare (Iperfagia, mangiare in pochi secondi).
 - Comportamento esplorativo caratterizzato da una esplorazione di tipo orale con distruzione e spesso ingestione del materiale distrutto.
 - Riduzione della durata del sonno, senza alterazioni del ciclo del sonno.
 - Tendenza a sporcare in casa.

La causa più probabile di questa sindrome è il precoce allontanamento dalla madre, tra la 4° e la 7° settimana e la conseguente mancata acquisizione dell’inibizione al morso e degli autocontrolli, altra causa può essere un ambiente poco stimolante nelle prime settimane di vita.



ALLEVAMENTO AMATORIALE DEL CANE DA CACCIA

“DEL BUGALLO”

Razze: Bracco Francese tipo Pirenei

Di “Franco Barsottini”

Iscritto al registro degli addestratori ENCI sez. 1

cani da utilità, compagnia agility e sport

Via Bugallo 1b – Crespina (PI)

Telefono 3381621719

www.allevamentodelbugallo.it

info@allevamentodelbugallo.it

Il disturbo specifico dell'iperattività è caratterizzato da:

- Sintomi di nervosismo e di iperattività presenti parecchie volte al giorno.
- Il cane prova spesso a muoversi o a scappare quando è costretto a restare in un determinato posto.
- Corre frequentemente, salta, si arrampica il tutto in modo eccessivo ed in situazioni non appropriate.
- Ha difficoltà a giocare in modo tranquillo e controllato.
- Vocalizza frequentemente ed in modo eccessivo.

Possono essere presenti segni di impulsività:

- Reagisce spesso al minimo stimolo anche prima di aver adattato la risposta alla situazione.
- Ha spesso difficoltà ad attendere il suo turno.
- Interrompe frequentemente gli altri o impone la propria presenza.
- Sembra incapace di controllare la propria eccitazione, diventa sovraeccitato, il che conduce ad aggressioni stereotipate o non controllate.
- Possono essere presenti segni di non attenzione e di distrazione.
- Ha difficoltà a mantenere l'attenzione nell'esplorazione e nelle attività.
- Frequentemente non ascolta quando gli si parla o lo si chiama.
- Spesso non segue le istruzioni e non arriva a rispondere a semplici comandi in una fase di apprendimento.
- E' spesso distratto da stimoli esterni.
- Di frequente sembra non abituarsi e dimentica la conoscenza acquisita degli oggetti o degli ambienti che ha appena esplorato.

Le cause più probabili sono la mancata fase di apprendimento con la madre o una inadeguata socializzazione nel periodo sensibile .

In questi casi il comportamento che deve tenere il proprietario dovrà essere quello di non interagire se mordicchia e dovrà sospendere immediatamente il gioco non appena il cucciolo esagera, dovrà evitare i giochi particolarmente eccitanti (Pageat 1999).

Sindrome da privazione sensoriale; E' caratterizzata dalla difficoltà di gestire le informazioni provenienti dall'ambiente esterno in soggetti allevati in ambienti



ALLEVAMENTO AMATORIALE DEL CANE DA CACCIA

“DEL BUGALLO”

Razze: Bracco Francese tipo Pirenei

Di “Franco Barsottini”

Isritto al registro degli addestratori ENCI sez. 1
cani da utilità, compagnia agility e sport

Via Bugallo 1b – Crespina (PI)

Telefono 3381621719

www.allevamentodelbugallo.it
info@allevamentodelbugallo.it

ipostimolanti (Pageat 1999). I soggetti affetti dalla patologia possono presentare 3 quadri clinici:

- **Stadio I (Fobie ontogenetiche)**, l'animale è incapace di stare a contatto con uno o più stimoli identificabili (rumori, bambini, bagliori, autoveicoli) e può reagire con fuga o aggressività. Si può associare “l'anticipazione emozionale” per cui oltre a reagire allo stimolo reagisce anche agli stimoli associati con aumento del numero degli stimoli che riescono a far scatenare la paura.
- **Stadio II (Ansia da privazione)**, Il cane reagisce con uno stato di inibizione espresso da posture caratteristiche e con attività di sostituzione come leccamento di un arto o il grattamento del collo, scatenate da un contesto conflittuale, che impedisce l'esecuzione di risposte adattive (Pageat 1999). Le attività di sostituzione non hanno alcuna relazione funzionale con lo stimolo scatenante e servono solo ad appagare l'animale. Sintomi sono un ridotto comportamento esplorativo, i pasti diurni sono brevi ed il cibo è consumato prevalentemente di notte, sono cani molto abitudinari con rigidità comportamentali, ad esempio compiono sempre lo stesso tragitto o sporcano nello stesso luogo, i cambiamenti abitudinari possono portare il cane ad attacchi di panico.
- **Stadio III (Stadio depressivo)**, si tratta di un vero stato di depressione facilmente rilevabile nei cuccioli, sintomi sono lo smettere di giocare, la scomparsa del comportamento esplorativo, il rimanere accucciato da una parte ed alzarsi per mangiare solo di notte, i comportamenti eliminatori non sono più controllati, compare enuresi ed encopresi, compaiono gravi disturbi del sonno

Disturbi del comportamento sociale. Per comportamento sociale si intende l'interazione tra due o più individui, i comportamenti sono una inappropriata interazione sociale e rientrano in questa sfera;

- **Depressione da distacco precoce**, i sintomi sono una ridotta tendenza al gioco, presenza di dondoli del corpo stereotipati, attività motoria assente, camminare con arti flessi ma non in atteggiamento di sottomissione, mancanza di qualsiasi segnale di comunicazione, mangiare poco ed in piccole quantità di solito la notte, presenza di scarso sviluppo corporeo, nei cuccioli non si ha alcun attaccamento intra o etero specifico. Maggiormente esposti a questa patologia sono i cuccioli la cui madre muore durante il parto o sono separati



ALLEVAMENTO AMATORIALE DEL CANE DA CACCIA

“DEL BUGALLO”

Razze: Bracco Francese tipo Pirenei

Di “Franco Barsottini”

Iscritto al registro degli addestratori ENCI sez. 1

cani da utilità, compagnia agility e sport

Via Bugallo 1b – Crespina (PI)

Telefono 3381621719

www.allevamentodelbugallo.it

info@allevamentodelbugallo.it

precocemente (Pageat 1999).

- Ansia da separazione, è un comportamento problematico che si manifesta soltanto in assenza reale o virtuale del proprietari (Borchelt e Voith 1982, Overall 1997) l’iperattaccamento è una condizione necessaria perché si possa parlare di ansia da separazione (King et. Al. 2000, Pageat 1998, McGrave 1991, Gaultier 2001). L’iperattaccamento può essere primario, quando l’attaccamento non si interrompe con il raggiungimento della pubertà, secondario se deriva invece a seguito di altri disturbi. I sintomi sono eliminazioni inadeguate, distruzione di oggetti, vocalizzazioni, saluti eccessivamente festosi, esplorazione a stella, il proprietario è seguito ovunque e non viene tollerata alcuna separazione solitamente il cane dorme sul letto o in un luogo dove può mantenere il contatto visivo.
- Disturbo dell’ansia generalizzata; sono caratterizzati da comportamenti di paura o di anticipazione, frequenti, eccessivi, non scatenati da stimoli obiettivi, specifici e ripetitivi.
- Disturbo dell’ansia da deritualizzazione; Si ha quando l’animale ha perso i suoi rituali sociali di tranquillizzazione, ad esempio si agita quando si trova lontano dal gruppo sociale.
- Sindrome dissociativa; la prima descrizione è del Pageat e presenta molti punti in comune con la schizofrenia umana. I sintomi sono riscontrabili ogni giorno ed a più riprese e sono:
 - Riduzione progressiva della recettività nei confronti dell’ambiente.
 - Allucinazioni a tema costante.
 - Stereopatie durante le fasi di allucinazione.
 - Fasi di ebetismo con attività somestesica.
 - Stadio pre-patologico con reazioni di evitamento o impulsive

E’ comunque un disturbo raro nel cane.

- Dissocializzazione primaria, si verifica in soggetti che hanno più di tre mesi è una patologia caratterizzata da comportamenti di aggressività, irritazione, dominanza che si scatenano dai tentativi da parte del proprietario di controllare le attività del cane.
- Personalità dissociale; E’ un disturbo della personalità ed è rappresentato dall’incapacità sempre maggiore di comunicare tramite rituali sociali di



ALLEVAMENTO AMATORIALE DEL CANE DA CACCIA

“DEL BUGALLO”

Razze: Bracco Francese tipo Pirenei

Di “*Franco Barsottini*”

Iscritto al registro degli addestratori ENCI sez. 1

cani da utilità, compagnia agility e sport

Via Bugallo 1b – Crespina (PI)

Telefono 3381621719

www.allevamentodelbugallo.it

info@allevamentodelbugallo.it

pacificazione e di sottomissione. La sociopatia descrive un disturbo nella relazione gerarchica tra un cane e un gruppo umano, i sintomi sono:

- Assenza di posture di pacificazione e di sottomissione.
- Assenza di una gerarchia alimentare.
- Irritabilità e aggressività in concomitanza della minaccia e dell’attacco nelle sequenze dell’aggressione competitiva e da irritazione.
- Morsi non controllati.
- Reazioni impulsive.